

Preguntas para Su Médico

Si tiene trombosis venosa profunda (DVT) o embolia pulmonar (PE), esta guía puede ser útil al hablar con su médico. Recuerde, las preguntas a continuación son sugerencias de temas que puede discutir, pero no son una herramienta de diagnóstico.

Preguntas sobre la trombosis venosa profunda (DVT) y la embolia pulmonar (PE):

- ¿Cuál es la diferencia entre una “trombosis” y una “embolia”?
- ¿Qué significa “pulmonar”?
- ¿Cómo la DVT puede llevar a la PE?
- ¿Corro riesgo de una recurrencia de DVT o PE?
- ¿Qué puedo hacer para reducir el riesgo de una recurrencia de DVT/PE?

Preguntas que debe hacer durante su estadía en el hospital:

- ¿Cuál será el tratamiento para mi DVT (o PE)?
- ¿Cuánto tiempo tengo que continuar con el tratamiento?
- ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de mi tratamiento?
- ¿Cuándo puedo reanudar mis actividades regulares?
- ¿Cuál es mi riesgo de tener otro coágulo sanguíneo por DVT/PE?

Preguntas sobre ELIQUIS:

- ¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre ELIQUIS?
- ¿Cuáles son las razones para considerar el uso de ELIQUIS?
- ¿Cuál es mi riesgo de sangrado con ELIQUIS?
- ¿Cuáles son algunos signos y síntomas de sangrado?
- ¿Qué efectos secundarios tengo que tener presentes al tomar un medicamento como ELIQUIS?
- ¿Es ELIQUIS adecuado para mí?

INDICACIONES

ELIQUIS (apixaban) es un medicamento disponible con receta usado para reducir el riesgo de derrame cerebral y coágulos sanguíneos en personas con fibrilación auricular, un tipo de latido cardíaco irregular, no causada por un problema en una válvula cardíaca.

ELIQUIS es un medicamento disponible con receta usado para tratar los coágulos sanguíneos en las venas de las piernas (trombosis venosa profunda) o en los pulmones (embolia pulmonar), y reducir el riesgo de que ocurran otra vez.

ELIQUIS es un medicamento disponible con receta usado para reducir el riesgo de formación de un coágulo sanguíneo en las piernas y en los pulmones de las personas que recién se han sometido a una cirugía de remplazo de cadera o rodilla.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Para personas que toman ELIQUIS contra la fibrilación auricular: No suspenda ELIQUIS® (apixaban) sin hablar con el médico que se lo recetó. Suspender ELIQUIS aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral.

Véase la Información Importante de Seguridad adicional en las páginas 2 a la 3, y la [Información sobre Prescripción completa de EE.UU.](#), incluidas la **Casilla de ADVERTENCIA** y la [Guía del Medicamento](#) o visite ELIQUISESPANOL.com.

Preguntas para Su Médico

Preguntas sobre el uso de ELIQUIS:

- ¿Cómo debo tomar ELIQUIS?
- ¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis?
- ¿Requeriré análisis de sangre de rutina para saber si ELIQUIS está funcionando?
- ¿Hay alguna restricción dietética mientras tomo ELIQUIS?
- ¿Tengo que continuar usando ELIQUIS para reducir el riesgo de una recurrencia de DVT o PE?
- ¿Afecta alguno de los medicamentos que tomo la forma en que trabaja ELIQUIS?
- ¿Durante cuánto tiempo tengo que tomar ELIQUIS?

¿Hay algo más que desea preguntar?

Use el espacio a continuación para anotar cualquier otra pregunta que desee hacer a su médico.

Antes de tomar ELIQUIS, informe a su médico si tiene alguno de los siguientes:

- Problemas renales o hepáticos
- Cualquier otra condición médica
- Problemas de sangrado
- Está embarazada o planifica quedar embarazada
- Está lactando o planifica lactar (Usted y su médico deben decidir si tomar ELIQUIS o lactar. No debe hacer ambas cosas).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Es posible que haya que suspender el uso de ELIQUIS antes de una cirugía o de un procedimiento médico o dental. El médico le dirá cuándo debe suspender ELIQUIS y cuándo debe comenzar a tomarlo de nuevo. Si tiene que suspenderlo, el médico le puede recetar otro medicamento para ayudarle a evitar que se forme un coágulo sanguíneo.

ELIQUIS puede causar sangrado, que puede ser grave y en raras ocasiones, llevar a la muerte porque ELIQUIS es un medicamento anticoagulante que reduce la formación de coágulos.

Usted puede correr un riesgo mayor de sangrado si toma ELIQUIS y usa otros medicamentos que aumentan su riesgo de sangrado, como aspirina, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (NSAIDs), warfarina (COUMADIN®), heparina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o inhibidores de la recaptación de serotonina norepinefrina (SSRI y SNRI, por sus siglas en inglés, respectivamente), y otros medicamentos para ayudar a prevenir o tratar los coágulos sanguíneos. **Informe al médico sobre todos los medicamentos que usa**, incluidos cualquier medicamento con y sin receta, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Mientras toma ELIQUIS, usted puede ser más propenso a que se le formen moretones y es posible que un sangrado tarde más de lo usual en detenerse.

Véase la *Información Importante de Seguridad adicional* en la página 3, y la *Información sobre Prescripción completa de EE.UU.*, incluidas la **Casilla de ADVERTENCIA** y la **Guía del Medicamento** o visite ELIQUISESPANOL.com.

Preguntas para Su Médico

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Llame al médico o procure atención médica inmediata si tiene alguno de estos signos o síntomas de sangrado mientras toma ELIQUIS:

- sangrado inesperado o sangrado que dure mucho tiempo, como sangrado inusual en las encías, sangrado nasal frecuente o sangrado menstrual o vaginal más profuso de lo normal
- sangrado intenso o que usted no puede controlar
- orina roja, rosada o de tonalidad marrón; heces rojas o negras (que parecen brea)
- toser o vomitar sangre o vómito que parece borra de café
- dolor, hinchazón o dolor articular inesperados
- dolores de cabeza o sensación de mareo o debilidad

ELIQUIS (apixaban) no es para pacientes que tienen válvulas cardíacas artificiales.

Coágulos (hematomas) espinales o epidurales. Las personas que toman ELIQUIS, y que reciben inyecciones espinales y epidurales de medicamento, o que se someten a una punción lumbar, corren el riesgo de formar un coágulo sanguíneo que puede causar la pérdida a largo plazo o permanente de la capacidad de movimiento (parálisis). El riesgo de desarrollar un coágulo espinal o epidural es mayor si:

- se le coloca en la espalda un tubo fino llamado catéter epidural para administrarle un medicamento
- usa un NSAIDs o un medicamento para evitar que la sangre se coagule
- tiene antecedentes de punciones epidurales o lumbares difíciles o repetidas
- tiene antecedentes de problemas espinales o ha tenido cirugía espinal

No tome ELIQUIS si, en la actualidad, tiene ciertos tipos de sangrado anormal o ha tenido una reacción alérgica grave a ELIQUIS.

Antes de tomar ELIQUIS, informe al médico si tiene problemas de los riñones o el hígado, tiene algún otro problema médico o alguna vez ha tenido problemas de sangrado. Informe al médico si está embarazada o lactando o si planifica quedar embarazada o lactar. Usted y su médico deben decidir entre tomar ELIQUIS o lactar. No debe hacer ambas cosas.

Tome ELIQUIS exactamente como se lo recetó el médico. Tome ELIQUIS dos veces al día todos los días con o sin alimentos y no cambie la dosis ni suspenda su uso a menos que el médico se lo indique. Si olvida una dosis de ELIQUIS, tómela tan pronto se acuerde y no tome más de una dosis a la vez. Si está tomando ELIQUIS contra la fibrilación auricular, suspenderlo puede aumentar el riesgo de sufrir un derrame cerebral. No deje que se le termine el medicamento. Compre su receta de ELIQUIS antes de que se le acabe. Cuando salga del hospital después de un replazo de cadera o rodilla, asegúrese de que tendrá ELIQUIS disponible para evitar perder alguna dosis.

Los posibles efectos secundarios graves incluyen sangrado o reacción a ELIQUIS. Una reacción a ELIQUIS puede causar urticaria, erupción, picor y, posiblemente, problemas para respirar. Si sufre esta reacción, por lo general, sucederá justo después de tomar una dosis de ELIQUIS. Procure atención médica inmediata si tiene dolor súbito de pecho u opresión en el pecho, tiene hinchazón súbita de la cara o la lengua, problemas para respirar, sibilancias o sensación de mareo o desfallecimiento.

Véase *Información Importante de Seguridad adicional a través y la Información sobre Prescripción completa de EE.UU.*, incluidas la **Casilla de ADVERTENCIA** y la **Guía del Medicamento** o visite ELIQUISESPANOL.com.