

Su guía para la conversación con el médico



Si usted **corre riesgo de sufrir un derrame cerebral debido a la fibrilación auricular (AFib, por sus siglas en inglés) –un tipo de latido cardíaco irregular– no causada por un problema en una válvula cardíaca**, esta guía puede ayudarle a tener una conversación productiva en su próxima cita médica. Tenga presente que las preguntas a continuación son sugerencias de temas para hablar con el médico y no tienen el propósito de ofrecer asesoramiento médico.

Marque las preguntas que quiera hacerle al médico

Para asegurarse de obtener las respuestas que necesita, **lea las preguntas a continuación y seleccione las que sean más importantes para usted**. Luego tome en cuenta cuánto tiempo tendrá con el médico y planifique la conversación.

i **Asegúrese de hablar con su médico sobre los beneficios, riesgos y posibles efectos secundarios de ELIQUIS® (apixaban). Véase la Información Importante de Seguridad, incluida la Casilla de ADVERTENCIAS, de ELIQUIS más adelante.**

ENTENDAMOS AFIB Y EL RIESGO DE DERRAME CEREBRAL

- ☐ ¿Qué es la AFib no causada por un problema en una válvula cardíaca y cuáles son sus posibles signos y síntomas?
- ☐ ¿Cómo la AFib no causada por un problema en una válvula cardíaca aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral?
- ☐ ¿Corro un riesgo mayor de sufrir un derrame cerebral incluso si no presento síntomas?
- ☐ ¿Qué puedo hacer para reducir el riesgo de derrame cerebral?

ENTENDAMOS LOS ANTICOAGULANTES

- ☐ ¿Por qué los médicos recetan anticoagulantes para reducir el riesgo de derrame cerebral a las personas con AFib no causada por un problema en una válvula cardíaca?
- ☐ ¿Cómo reducen los anticoagulantes el riesgo de sufrir un derrame cerebral debido a la AFib no causada por un problema en una válvula cardíaca?
- ☐ ¿Por qué los anticoagulantes aumentan el riesgo de sangrado?
- ☐ ¿Cuáles son algunos posibles signos y síntomas de sangrado?
- ☐ ¿Qué se considera un sangrado mayor y sangrado menor al tomar un anticoagulante?
- ☐ ¿Cómo sé si el sangrado o los hematomas son lo suficientemente graves para buscar ayuda médica?

CONOZCA SOBRE ELIQUIS

- ☐ ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de ELIQUIS?
- ☐ ¿Hay algo más que deba saber si cambio mi medicamento a ELIQUIS?
- ☐ ¿Durante cuánto tiempo debo usar ELIQUIS?
- ☐ ¿Quién no debe usar ELIQUIS?
- ☐ ¿Cómo sabré que ELIQUIS está surtiendo efecto si no me administran pruebas de sangre de rutina?
- ☐ ¿Es necesario cambiar mi dieta mientras uso ELIQUIS?
- ☐ ¿Es ELIQUIS adecuado para mí?

INDICACIÓN

ELIQUIS (apixaban) es un medicamento disponible con receta usado para reducir el riesgo de derrame cerebral y coágulos sanguíneos en personas que padecen de fibrilación auricular (AFib, por sus siglas en inglés) –un tipo de latido cardíaco irregular– no causada por un problema en una válvula cardíaca.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Para personas que toman ELIQUIS® (apixaban) contra la fibrilación auricular: No suspenda ELIQUIS sin hablar con el médico que se lo recetó. Suspenda ELIQUIS aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral.

Es posible que haya que suspender el uso de ELIQUIS antes de una cirugía o de un procedimiento médico o dental. El médico le dirá cuándo debe suspender ELIQUIS y cuándo debe comenzar a usarlo de nuevo. Si tiene que suspenderlo, el médico le puede recetar otro medicamento para ayudarle a evitar que se forme un coágulo sanguíneo.

ELIQUIS puede causar sangrado, que puede ser grave, y, en raras ocasiones, llevar a la muerte porque ELIQUIS es un medicamento anticoagulante que reduce la formación de coágulos.

Véase la Información Importante de Seguridad adicional en las páginas 2 y 3, y la **Información sobre Prescripción completa para los EE. UU.**, incluida la **Casilla de ADVERTENCIAS** y la **Guía del Medicamento**, o visite ELIQUISESPANOL.com.



Notas

Antes de usar ELIQUIS® (apixaban), informe a su médico si usted:

- ☐ tiene problemas renales o hepáticos
 - ☐ tiene síndrome de anticuerpos antifosfolípidos
 - ☐ tiene cualquier otro problema médico
 - ☐ tiene problemas de sangrado
 - ☐ está embarazada o planifica quedar embarazada
 - ☐ está lactando o planifica hacerlo
- (Usted y su médico deben decidir si usar ELIQUIS o lactar. No debe hacer ambas cosas.)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Puede que usted corra un riesgo mayor de sangrado si usa ELIQUIS y otros medicamentos que aumentan el riesgo de sangrado, como aspirina, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (NSAIDs), warfarina, heparina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina-norepinefrina (SSRI y SNRI, por sus siglas en inglés, respectivamente) y otros medicamentos para ayudar a evitar o a tratar los coágulos sanguíneos. Informe al médico sobre todos los medicamentos que usa, incluidos cualquier medicamento sin receta, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Mientras toma ELIQUIS, usted puede ser más propenso a que se le formen moretones y es posible que un sangrado tarde más de lo usual en detenerse.

Llame al médico o procure atención médica inmediata si tiene alguno de los siguientes signos o síntoma de sangrado mientras usa ELIQUIS:

- sangrado inesperado o sangrado que dura mucho tiempo, como sangrado inusual en las encías, sangrado nasal que se presenta frecuentemente o sangrado menstrual o vaginal más abundante de lo normal
- sangrado grave o que no pueda controlar
- orina de color rojo, rosa o café; heces color rojo o negro (que parecen brea)
- vomitar sangre o su vómito se ve como si tuviera café molido
- dolor inesperado, inflamación o dolor articular
- dolores de cabeza o sensación de mareo o debilidad

ELIQUIS (apixaban) no es para pacientes que tienen válvulas cardíacas artificiales.

Véase la Información Importante de Seguridad adicional en las páginas 3, y la *Información sobre Prescripción completa para los EE. UU.*, incluida la **Casilla de ADVERTENCIAS** y la *Guía del Medicamento*, o visite ELIQUISESPANOL.com.



Su guía para la conversación con el médico



¿Hay algo más que quiera preguntar?

Use el espacio a continuación para anotar cualquier otra pregunta que quiera hacerle al médico.

Haga una lista de todos los medicamentos que usa

Debe llevar a su cita médica una lista de todos los medicamentos y suplementos que usa. Ciertos medicamentos pueden afectar la forma en que funciona ELIQUIS® (apixaban) y otros pueden aumentar el riesgo de sangrado o de derrame cerebral cuando se usan con ELIQUIS.



Asegúrese de llevar esta guía a su próxima cita.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Coágulos (hematomas) espinales o epidurales. Las personas que usan ELIQUIS y reciben inyecciones espinales o epidurales de medicamento, o que se someten a una punción lumbar, corren el riesgo de formar un coágulo sanguíneo que puede causar la pérdida a largo plazo o permanente de la capacidad de movimiento (parálisis). El riesgo de desarrollar un coágulo espinal o epidural es mayor si:

- se le coloca en la espalda un tubo fino llamado catéter epidural para administrarle un medicamento
- usa medicamentos antiinflamatorios no esteroides (NSAIDs) o un medicamento para evitar que la sangre se coagule
- tiene antecedentes de punciones epidurales o lumbares difíciles o repetidas
- tiene antecedentes de problemas espinales o ha tenido cirugía espinal

Si usted toma ELIQUIS y recibe anestesia espinal o se somete a una punción lumbar, el médico debería vigilarle de cerca para detectar síntomas de coágulos sanguíneos o de sangrado espinal o epidural. Informe de inmediato al médico si tiene hormigueo, adormecimiento o debilidad muscular, especialmente en las piernas y los pies.

ELIQUIS no está indicado para pacientes con síndrome antifosfolípido (APS, por sus siglas en inglés), que tienen antecedentes de coágulos sanguíneos, particularmente si presentan triple positividad de dichos anticuerpos.

No tome ELIQUIS si, en la actualidad, tiene ciertos tipos de sangrado anormal o ha tenido una reacción alérgica grave a ELIQUIS.

Antes de tomar ELIQUIS, informe al médico si tiene problemas de los riñones o el hígado, tiene síndrome antifosfolípido, tiene algún otro problema médico o alguna vez ha tenido problemas de sangrado. Informe al médico si está embarazada o lactando o si planifica quedar embarazada o lactar. Usted y su médico deben decidir si usar ELIQUIS o lactar. No debe hacer ambas cosas.

Tome ELIQUIS exactamente como se lo recetó el médico. Tome ELIQUIS dos veces al día todos los días con o sin alimentos, y no cambie la dosis ni suspenda su uso a menos que el médico se lo indique. Si olvida una dosis de ELIQUIS, tómela tan pronto se acuerde y no tome más de una dosis a la vez. **Si está tomando ELIQUIS contra la fibrilación auricular, suspenderlo puede aumentar el riesgo de sufrir un derrame cerebral. No deje que se le termine el medicamento. Compre su receta de ELIQUIS antes de que se le acabe.** Cuando salga del hospital después de un replazo de cadera o rodilla, asegúrese de que tendrá ELIQUIS disponible para evitar perder alguna dosis.

Los posibles efectos secundarios graves incluyen sangrado o reacción a ELIQUIS. Una reacción a ELIQUIS puede causar urticaria, erupción, picor y, posiblemente, problemas para respirar. Si sufre esta reacción, por lo general, sucederá justo después de tomar una dosis de ELIQUIS. Procure atención médica inmediata si tiene dolor súbito de pecho u opresión en el pecho, tiene hinchazón súbita de la cara o la lengua, problemas para respirar, sibilancias o sensación de mareo o desfallecimiento.

Véase la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo del texto, y la *Información sobre Prescripción completa para los EE. UU.*, incluida la **Casilla de ADVERTENCIAS** y la **Guía del Medicamento**, o visite ELIQUISESPANOL.com.



Bristol Myers Squibb

